

Alternaria

Aktuell kein Befall

Bei unseren Kontrollen in den starken Befallslagen konnten wir erst in den letzten Tagen und nur bei der Sorte Gala ganz vereinzelt Fruchtflecken finden. Bei den Sorten Golden Delicious und Pink Lady konnten wir bisher keinen Alternariafrucht- oder Blattbefall feststellen.

Mit den aktuell warmen Temperaturen ist bei zukünftigen Regenereignissen mit günstigen Bedingungen für Alternariainfektionen zu rechnen.

Empfehlungen

Bei den für Alternaria anfälligen Sorten können im Sommer folgende Wirkstoffe eingesetzt werden:

- Dodine
- Kaliumphosphonat
- Fluazinam
- Metiram
- Fludioxonil

Kaliumphosphonat hat ein sehr ungünstiges Abbauverhalten, weshalb bei der Ausbringung Abdrift auf Nicht-Zielflächen, wie z. B. Bioparzellen, unbedingt vermieden werden sollte.

Termine der Bienenwanderung

In der unten angeführten Tabelle sind die offiziellen Zeiträume gelistet, in denen es verboten war, in den verschiedenen Höhenlagen bienengefährliche Mittel einzusetzen. Diese haben bei der Betriebsheftkontrolle

Gültigkeit, außer, wenn im Betriebsheft ein früherer Blühbeginn bzw. ein späteres Blühende eingetragen wurde.

Meereshöhe/Sorte	Letzter möglicher Behandlungstag	Beginn 00:00 Uhr	Ende 24:00 Uhr	Erster möglicher Behandlungstag
Anlagen der Sorten Cripps Pink, Rosy Glow und deren Klone	27. März 2019	28. März 2019	25. April 2019	26. April 2019
Lagen bis 500 m Mh.	30. März 2019	31. März 2019	25. April 2019	26. April 2019
Lagen von 500 bis 800 m Mh.	3. April 2019	4. April 2019	1. Mai 2019	2. Mai 2019
Lagen über 800 m Mh.	13. April 2019	14. April 2019	12. Mai 2019	13. Mai 2019