

## Psilla estiva

Due settimane dopo il trattamento in pre-fioritura si può effettuare un trattamento con un prodotto a base di tau-fluvalinate o tiaclopid.

### Piante messe a dimora quest'anno

Sulle piante messe a dimora quest'anno, consigliamo di intervenire contro la psilla estiva non appena raggiungono lo stadio di ripresa vegetativa. Durante la migrazione delle api e durante la fioritura delle giovani piante si dovrebbe utilizzare una-due volte, a questo scopo, un prodotto contenente tau-fluvalinate.

## Ticchiolatura

Data la prolungata assenza di piogge e il rapido progresso dello sviluppo vegetativo, la prossima pioggia dovrebbe essere coperta – il più prossimamente

possibile rispetto al suo inizio – con un fungicida di contatto.

## Prevenire i marciumi calicini e del cuore

Sulle varietà Red Delicious, Fuji e Modì soprattutto la botrite, in presenza di persistente bagnatura fogliare in fioritura o immediatamente dopo la sua conclusione, causa la comparsa di marciumi calicini e del cuore. Se

in questo periodo, al verificarsi di precipitazioni, si utilizzano prodotti contenenti fluazinam o, in post-fioritura, carbossamidi, si può contare su un loro effetto secondario contro *Botrytis*.