


Retrospezione sulla stagione delle infezioni primarie di ticchiolatura nella Bassa Atesina



Abbiamo terminato i rilievi sulla ticchiolatura dopo la conclusione del periodo delle infezioni primarie. Una lunga fase siccitosa ha caratterizzato quest'anno il periodo tra fine marzo e oltre metà aprile. Solo a partire dal 19 aprile è stata nuovamente registrata la caduta di precipitazioni regolari. La difesa antiticchiolatura ha dato buoni risultati nella maggior parte dei frutteti. Tra le infezioni verificatesi, quasi tutte hanno provocato un

attacco di ticchiolatura nelle parcelle testimone. Per questo il numero e la gravità delle infezioni secondarie e dell'attacco sui frutti sono stati molto rilevanti.

La difesa antiticchiolatura in estate

Si possono impiegare i fungicidi antiticchiolatura captano, dodina e solfato di rame.

Ultime notizie su *Alternaria*

L'andamento meteorologico caldo e umido delle ultime settimane ha favorito lo sviluppo dell'*Alternaria*. Da circa dieci giorni sono comparse macchie fogliari di *Alternaria*

su **Golden Delicious** coltivata nelle zone notoriamente a rischio del fondovalle. Durante i controlli abbiamo rinvenuto anche macchie su frutto.