

La stagione della ticchiolatura è iniziata

Le temperature decisamente miti delle ultime settimane hanno provocato, su Pink Lady coltivata nelle zone più precoci, il raggiungimento dello stadio fenologico di "rottura gemme". Non appena sono visibili i primi organi verdi, è possibile avvengano infezioni di ticchiolatura. Il servizio di allertamento antiticchiolatura è ora attivo.

Scarsa disponibilità di dithianon

A causa di difficoltà insorte nella produzione della sostanza attiva dithianon, quest'anno la disponibilità di formulati che la contengono è molto limitata e fino all'estate, la situazione non subirà modifiche.

Trattare preventivamente

A partire dalla ripresa vegetativa, ogni fase piovosa dovrebbe essere coperta preventivamente con un fungicida di contatto. Il trattamento dovrebbe essere effettuato quanto più prossimo possibile all'inizio della pioggia.

Contro la ticchiolatura si possono impiegare prodotti con le seguenti sostanze attive:

- Trifloxystrobin, Polisolfuro di Ca
- Boscalid
- IBE
- Pirimetanil, Ciprodinil
- Captano, Ditanon
- Metiram, Mancozeb
- Fluazinam
- Dodina
- Penthiopyrad
- Prodotti rameici
- Fluxapyroxad
- Fosfonato di potassio
- Polisolfuro di calcio