

## I trattamenti di chiusura sulle varietà autunnali

### Golden Delicious e Pink Lady

Entrambe le varietà sono molto sensibili alla ticchiolatura tardiva. Il trattamento di chiusura dovrebbe essere effettuato tre settimane prima dell'inizio della raccolta con un **prodotto a base di captano**. In caso di abbondanti precipitazioni dopo il trattamento di chiusura è ancora possibile utilizzare **prodotto a base di boscalid**.

In alternativa a un prodotto a base di boscalid si può utilizzare anche un **prodotto a base di fludioxonil**.

Nei frutteti di Golden Delicious situati in aree notoriamente soggette a gravi attacchi di Alternaria, si dovrebbe provvedere quanto prima a raccogliere dopo l'apertura della finestra di raccolta.

**Red Delicious, Granny Smith, Fuji, Braeburn, Morgenduft, Winesap, Jazz, Kanzi, Pinova, Jonagold, Envy, Modí, yello, Tessa**

### Ticchiolatura

Su queste varietà consigliamo di effettuare un trattamento di chiusura con un **prodotto a base di captano** tre settimane prima dell'inizio della raccolta. Poiché queste varietà (con l'eccezione di Pinova, yello e Tessa) tollerano bene il rame, nei frutteti colpiti da ticchiolatura è ancora possibile – in condizioni di tempo perturbato – applicare un **prodotto contenente solfato di rame**.

### Marciumi da conservazione

Contro i marciumi da conservazione, in caso di necessità, si possono impiegare prodotti a base di fludioxonil.

### Evitare la deriva e i residui indesiderati

Quanto più ci si avvicina alla raccolta, tanto più importante è evitare la deriva su parcelle biologiche e su varietà con diversi tempi di raccolta.