

## Alternaria su Pink Lady

L'andamento meteorologico umido delle ultime settimane è risultato molto favorevole allo sviluppo dell'*Alternaria*. Nelle ultime due settimane abbiamo verificato la presenza di un attacco fresco su Pink Lady. Finora non abbiamo mai avuto occasione di rilevare infezioni da parte di questo fungo così tardi nella stagione. Solitamente si trovano anche macchie di *Alternaria* sulle foglie.

Consigliamo, nei frutteti nei quali si manifesta un attacco fresco sui frutti, di intervenire prima della prossima precipitazione con fludioxonil o boscalid.



## Patina bianca e fumaggini

Le condizioni meteorologiche delle ultime settimane hanno favorito l'incremento della pressione infettiva di diverse patologie fungine, quali ad esempio la patina bianca, soprattutto nei frutteti del fondovalle. Risultano interessate tutte le varietà a raccolta tardiva. Consigliamo di attuare tutte le misure agronomiche che facilitano una rapida asciugatura delle piante (foglie e frutti).

Quest'anno si rileva anche un notevole attacco di funghi appartenenti alle fumaggini. Nelle parcelle testimone si riscontra un attacco anche su tutti i frutti. Anche in questo caso, al momento si possono solo attuare tutte le misure agronomiche che contribuiscono a far asciugare rapidamente le piante.



Maculatura fuliginosa causata dai patogeni presenti su una mummia



Grave attacco di patina bianca

## Trattamento erbicida in post-raccolta

Se in post-raccolta si effettua un trattamento erbicida con glifosato, il sottofila dei meli rimane libero dalla flora spontanea fino alla fioritura dell'anno successivo. Per

questo intervento è sufficiente utilizzare la dose dimezzata di un prodotto contenente glifosato.