

La difesa antiticchiolatura nelle zone sensibili secondo il PAN

Se si utilizzano prodotti sulle cui etichette compaiono specifiche frasi H, è necessario rispettare una distanza di sicurezza da determinate zone sensibili (es. scuole, asili ecc.), che corrisponde a 10 m se – come d'obbligo - i fitosanitari vengono distribuiti con ugelli a getto piatto ad aspirazione d'aria (antideriva).

Tra essi troviamo per esempio prodotti a base di dithianon, fluazinam, mancozeb, captano e polisolfuro di calcio.

Invito a raccogliere esemplari di cimice asiatica

Per la moltiplicazione programmata di *Trissolcus japonicus* (antagonista naturale della cimice asiatica), i collaboratori del Centro di Sperimentazione Laimburg necessitano di una gran quantità di **cimici per l'allevamento massale**. Nei prossimi giorni e settimane, gli adulti di *Halyomorpha halys* lasceranno i luoghi di svernamento (es. edifici). Per questo invitiamo tutti a raccogliere in contenitori di vetro (lasciando qualche foro di piccole dimensioni sul coperchio) il maggior numero possibile di esemplari di cimice asiatica **da adesso fino a fine marzo**.

Chi cattura questi insetti, può consegnarli direttamente presso la sede del Centro di Sperimentazione Laimburg (lun-ven, dalle 8 alle 16) o presso gli uffici distrettuali del Centro di Consulenza. Se possibile, le cimici non dovrebbero permanere oltre 48 h nei contenitori per evitare la perdita di vitalità che ne compromette la

possibilità di essere impiegate per la moltiplicazione massale.

Gli operatori del Centro di Sperimentazione Laimburg e del Centro di Consulenza ringraziano fin d'ora per la collaborazione.

