

La difesa dai roditori nel post-raccolta

Di regola, la densità massima di popolazione dei roditori (topi campagnoli e arvicole) si raggiunge nel tardo autunno. Di conseguenza, i danni si manifestano prevalentemente durante il periodo di riposo vegetativo. Per la difesa diretta dai roditori in produzione integrata **non sono disponibili, attualmente, rodenticidi da impiegare in pieno campo.**

In commercio si trova una serie di esche avvelenate, il cui utilizzo è ammesso in ambito casalingo, ma che non possono essere distribuite in pieno campo per la difesa delle colture agricole. In passato si sono verificate continuamente situazioni di denuncia che hanno avuto ripercussioni sull'utilizzatore.

Scopazzi del melo: estirpare subito le piante sintomatiche

Secondo i nostri rilievi e le nostre osservazioni, il numero di piante con sintomi da scopazzi nelle zone fortemente colpite è, in media, molto contenuto. In alcuni frutteti in produzione, però, abbiamo constatato un incremento di meli interessati dalla fitoplasmosi.

Consigliamo di controllare con attenzione tutti gli impianti e di estirpare immediatamente tutte le piante sintomatiche. Anche gli apparati radicali devono essere interamente asportati. Le esperienze degli ultimi anni confermano che in genere nei frutteti già controllati, dopo la raccolta si individuano altre piante con sintomi di scopazzi. Consigliamo di estirpare anche questi meli.