

Programmare i trattamenti di chiusura

La riduzione del numero e della quantità di residui di fitosanitari nel vino è un obiettivo molto importante e per raggiungerlo si dovrebbe **rispettare un intervallo di almeno 40 giorni tra l'ultimo trattamento e la vendemmia**.

Riteniamo che quest'anno in Alto Adige la vendemmia dei vitigni a bacca bianca potrà avere inizio, nelle zone più precoci, a partire dal 20 agosto. In conseguenza dovrà anche essere fissata la data dell'ultimo intervento di

difesa. La tabella sottostante riporta i momenti ottimali per effettuare il trattamento di chiusura sui diversi vitigni e nelle differenti zone.

Se non intervengono difficoltà legate all'andamento meteorologico e nei vigneti con sviluppo equilibrato delle viti è possibile interrompere i trattamenti anche prima delle date indicate.

Momento ottimale per effettuare i trattamenti di chiusura antiperonosporici e antioidici nel rispetto dell'intervallo di 40 giorni tra la loro esecuzione e la data prevista per l'inizio della vendemmia.

Vitigni	10-20 luglio	20-30 luglio	1°-10 agosto	10-20 agosto	15-25 agosto
Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon	zone precoci	zone mediamente favorite	zone tardive		
Müller Thurgau		zone mediamente favorite	zone tardive		
Traminer aromatico, Moscato giallo, Riesling, Kerner		zone precoci	zone mediamente favorite	zone tardive	
Schiava, Lagrein, Merlot			zone precoci	zone mediamente favorite	zone tardive
Cabernet					zone precoci e mediamente favorite


Oidio

Situazione attuale

La maggior parte dei vigneti non mostra sintomi di oidio. Solo in qualche impianto coltivato con vitigni altamente sensibili si riscontra un attacco con, in generale, solo pochi acini colpiti.

Dato l'andamento meteorologico primaverile decorso sfavorevole all'oidio, nelle nostre parcelle testimone abbiamo osservato un'evoluzione dell'attacco molto più rallentata rispetto agli anni scorsi.

Scelta dei prodotti

Dove si rinviene un attacco di oidio sugli acini consigliamo, se si decide di applicare Cidely, Rebel Top, Domark 125, Concorde 40 EW, Emerald 40 EW, Lidal o Sarumo, di miscelare questi prodotti con 250 - 300 g/hl di zolfo bagnabile. Ciò riduce la costituzione di resistenza da parte del fungo nei confronti delle sostanze attive a rischio. Se invece si propende per distribuire Heliosoufre S o Thiopron  si può rinunciare all'aggiunta di zolfo bagnabile.

Ultimo trattamento antioidico

- Sui vitigni scarsamente sensibili all'oidio, il trattamento di chiusura contro questa patologia è da effettuare ad inizio maturazione (ammorbidamento dei primi acini).
- Lagrein, Chardonnay, Müller Thurgau e Kerner dovrebbero essere trattati quando ca. un terzo degli acini è morbido o colorato.
- Su Schiava, il trattamento di chiusura dovrebbe avvenire quando gran parte degli acini è colorato. **Per motivi tecnici legati alla formazione di aromi indesiderati nel vino consigliamo di utilizzare prodotti contenenti zolfo, su Schiava, al massimo una sola volta dopo inizio maturazione.**