

## Aktueller Vegetationsstand

In den **frühen und mittleren Lagen** haben inzwischen alle Sorten ausgetrieben. Auch in den **Hang- und Hügellagen** bis ca. 500 m Mh. sind bei den Hauptsorten bereits grüne Pflanzenteile sichtbar.

In den **späten Tallagen** befinden sich die meisten Sorten noch im Knospenschwellen.

Im Vergleich zum Vorjahr erheben wir aktuell in jenen Lagen, wo es bereits ausgetrieben hat, einen Vegetationsrückstand von einigen Tagen.

## Bekämpfung des Weißdornblattsaugers

Die Populationsdichte des Weißdornblattsaugers lag in den letzten Jahren auf einem niedrigen Niveau, sodass die Eingriffsschwelle nur vereinzelt erreicht wurde. Im heurigen Jahr finden wir bei unseren Klopfproben wieder deutlich mehr Weißdornblattsauger. Bei Bedarf können Etofenprox oder Phosmet eingesetzt werden.

Die Mittel sind bienengefährlich. Wir empfehlen die Behandlungen außerhalb des Bienenflugs durchzuführen. Abdrift auf bereits blühende Pflanzen muss unbedingt vermieden werden. Vor einer Behandlung sollten Standimker darüber informiert werden.

## Schildlausbekämpfung

Vom Austrieb bis zum Rote Knospen-Stadium können zur Bekämpfung der San José-Schildlaus folgende Wirkstoffe eingesetzt werden:

- Pyriproxyfen
- Paraffinöl
- Phosmet

Pyriproxyfenmittel dürfen insgesamt nur einmal in der Vorblüte eingesetzt werden.

## Pockenmilben

In Anlagen, wo im Vorjahr ein Befall von Pockenmilben festgestellt wurde, kann ab dem Austrieb **Netzschwefel** eingesetzt werden.

