



## Sommerapfelblattsauger

Ungefähr zwei Wochen nach der Vorblütenbehandlung empfehlen wir in den **Befallslagen** eine Behandlung mit einem Tau-Fluvalinatmittel.

Da diese Behandlung in die Zeit der Bienenwanderung fällt, **muss** sie außerhalb des Bienenflugs (früher Morgen oder in den Abendstunden) durchgeführt werden.

### Zusatzinformationen

Wir empfehlen Tau-Fluvalinatmittel während der Blüte nicht mit Sterolsynthesehemmern zu mischen, da nach neueren

Studien diese Mischung Bienenschäden verursachen kann, wenn die Bienen damit in direkten Kontakt kommen.

### Heuer gepflanzte Bäume

Wir empfehlen die heuer gepflanzten Bäume gegen den Sommerapfelblattsauger zu behandeln, sobald sie austreiben. Während der Zeit der Bienenwanderung bzw. während der Blüte der Jungbäume sollte dafür ein- bis zweimal ein **Tau-Fluvalinatmittel** eingesetzt werden.

## Apfelschorf

Die nächste Blattnassperiode sollte möglichst nahe am Regenbeginn vorbeugend mit einem Kontaktfungizid abgedeckt werden.

Liste der Wirkstoffe gegen Apfelschorf siehe Rundschreiben Nr. 3 vom 02.03.2021.