

## Fruchtschädigende Wanzen

### Marmorierte Baumwanze

Bei unserem Monitoring finden wir die meisten Marmorierten Baumwanzen auf anderen Wirtspflanzen wie Hecken oder anderen Obstbäumen, wie z. B. Pfirsich. In den Apfelanlagen haben die Wanzen allerdings in den letzten Tagen zugenommen. Vor allem an den Randreihen hin zu Wirtspflanzen oder Böschungen, aber auch in den Anlagen der Talsohle werden nun vereinzelt Eigelege und Nymphen bzw. Adulte auf dem Hagelnetz gefunden.

Besonders an den Randreihen oder Kopfbäumen sind auch vereinzelt Einstiche an den Früchten, vor allem bei der Sorte Gala zu finden. Diese zeigen sich durch eine deutliche Rotfärbung an der Einstichstelle (siehe Foto). Das darunterliegende Fruchtfleisch ist braun gefärbt und verkorkt.

Zur Mittelwahl: siehe frühere Rundschreiben.



## Alternaria

### Aktuelle Befallssituation

Die Witterung der letzten Wochen war für die Entwicklung des Alternariapilzes günstig. Auch bei der Sorte Gala sind letztthin noch einige frische Fruchtflecken dazugekommen, welche auf die Regenschauer und die feuchtwarme Witterung der letzten Wochen zurückgehen.

Bei der Sorte Golden Delicious sind in vielen Anlagen

Blattflecken sichtbar. Frischer Fruchtbefall konnte auch in den starken Befallszonen bisher nicht festgestellt werden. Bei Pink Lady ist die Situation bisher ruhig.

### Alternariabekämpfung

Informationen zur Alternariabekämpfung finden Sie auf dem Rundschreiben Nr. 23.