

## La difesa antiticchiolatura nelle zone sensibili secondo il PAN

Per distribuire i prodotti sulla cui etichetta sono riportate determinate frasi H, è necessario mantenere una distanza di sicurezza da specifiche zone sensibili (es. scuole, asili ecc.). Con l'utilizzo obbligatorio di ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria, la distanza si riduce a 10 m. I prodotti interessati sono contraddistinti, nella Guida e nelle circolari, dal simbolo **H**.

Tra essi si trovano i formulati contenenti dithianon, fluazinam, mancozeb e captano, oltre al polisolfuro di calcio. Questa prescrizione rende difficoltosa la difesa antiticchiolatura in questi ultimi metri.

## Invito a raccogliere esemplari di cimice asiatica

Gli operatori del Centro di Sperimentazione Laimburg necessitano, per la moltiplicazione di *Trissolcus japonicus* – antagonista naturale della cimice asiatica – di una grande quantità di esemplari di ***Halyomorpha halys* per il loro allevamento massale**. Per questo invitiamo tutti a raccogliere in contenitori asciutti (es. vetro) individui di cimice asiatica a partire **da subito e fino a fine marzo**. Sul coperchio dei contenitori si dovrebbero praticare alcuni fori che permettano il passaggio di aria.

Dopo una cattura numerosa, è possibile consegnare gli insetti direttamente presso la sede del Centro di Sperimentazione Laimburg (lun-ven, dalle 8 alle 16). In alternativa, in caso di una cattura numerosa, i collaboratori dello stesso Centro possono anche ritirare le cimici direttamente presso chi le ha catturate. Vi invitiamo a contattare il Centro al recapito telefonico 0471/969630 (lun-ven, dalle 8 alle 17).

Se possibile, le cimici non dovrebbero rimanere per più di 48 ore nei contenitori, per evitare che la loro vitalità diminuisca e non siano più adatte all'allevamento massale.

I collaboratori del Centro di Sperimentazione Laimburg e del Centro di Consulenza ringraziano fin d'ora per la disponibilità.

