

Trattamenti di chiusura – varietà autunnali

Ticchiolatura

Il trattamento di chiusura dovrebbe avere luogo tre settimane prima dell'inizio della raccolta con un **prodotto contenente captano**.

Su tutte le varietà che ben tollerano i prodotti rameici, in caso di andamento meteorologico sfavorevole sussiste la possibilità – **nei frutteti colpiti da ticchiolatura** – di utilizzare un **prodotto contenente solfato di rame**.

Golden Delicious e Pink Lady

Su **Golden Delicious** nelle **zone notoriamente soggette a gravi attacchi di *Alternaria*** sarebbe opportuno, poco prima dell'inizio della raccolta, impiegare ancora **Fludioxonil** contro *Alternaria* e altre patologie da conservazione.

Su Pink Lady e yello appare ragionevole intervenire con Fludioxonil contro le patologie da conservazione se cadono abbondanti precipitazioni prima della raccolta.

In caso di forti precipitazioni che si presentino dopo il trattamento di chiusura con un prodotto a base di captano, su **Golden Delicious** si dovrebbe utilizzare ancora **Boscalid**.

Marciumi da conservazione

In generale, la miglior misura preventiva contro l'insorgenza dei marciumi da conservazione è la raccolta a tempo debito dei frutti.

Poco prima dell'inizio della raccolta, alcune varietà dovrebbero essere trattate, dopo aver eseguito un trattamento di chiusura con un prodotto contenente captano, con **Fludioxonil**.

Evitare la deriva e i residui indesiderati

Quanto più ci si avvicina alla raccolta, tanto più importante è evitare la deriva dei fitosanitari sulle superfici biologiche e su varietà con differenti finestre di raccolta.

È quindi necessario fare particolare attenzione ai seguenti punti:

- Trattare solo in assenza di vento.
- Distribuire i fitosanitari in modo mirato, chiudere gli ugelli superflui e adattare la quantità e la velocità dell'aria al volume fogliare delle piante (la nuvola di miscela non dovrebbe raggiungere la fila successiva).
- Trattare l'ultima fila solo in direzione del blocco varietale da trattare o del proprio appezzamento.
- Lavare bene il serbatoio. Questa operazione è particolarmente importante se si utilizza l'atomizzatore per trattare anche altre colture, distribuendo sostanze attive non autorizzate per l'impiego su melo.

Impedire la cascola precoce dei frutti

Sulle varietà che tendono alla cascola precoce dei frutti (es. Red Delicious, Jazz, Braeburn, Winesap e Modi) è

possibile impiegare prodotti a base di NAA per la prevenzione. L'efficacia rimane per 2 - 4 settimane.