

Peronospora

Servizio di allertamento in viticoltura

A partire dallo stadio di 3 foglie distese, gli stomi presenti sulla pagina inferiore delle foglie sono completamente formati e attraverso loro può quindi verificarsi un'infezione primaria di peronospora.

Inizio della difesa

In generale, consigliamo di dare avvio alla difesa alla scadenza del periodo di incubazione della prima infezione primaria e non appena si prevedono precipitazioni.

In situazioni particolari può essere necessario effettuare un trattamento anche prima di un'infezione primaria. La valutazione della situazione si fa tenendo conto di diversi parametri, quali ad esempio il grado di germinabilità delle spore invernali, lo stadio di sviluppo fogliare, le previsioni meteorologiche e il rischio generico, per il vigneto, di essere soggetto ad infezioni primarie.

La difesa dopo l'inizio dell'infezione in situazioni critiche

In generale consigliamo di praticare una strategia di difesa preventiva. Un trattamento dopo l'inizio dell'infezione dovrebbe essere effettuato solo in condizioni eccezionali.

Limitazioni previste nelle aree di tutela delle acque potabili

La normativa attualmente in vigore sulle aree di tutela delle acque potabili prevede che nel bacino idrografico delle fonti di acqua potabile possano essere utilizzati solo i fitosanitari inseriti nella lista positiva approvata dalla Giunta provinciale. I fosfonati e oxathiapiprolin (prodotti denominati Zorvec) non sono stati inseriti nella lista positiva e non possono quindi essere impiegati nelle aree di tutela delle acque potabili. Ulteriori informazioni su queste aree sono reperibili alle pagg. 183 - 184 della Guida.

Peristenza d'azione degli antiperonosporici

Il servizio di allertamento fornisce, relativamente alla peronospora, lo sviluppo settimanale delle foglie della vite.