

Die Schorfseason hat begonnen

In den frühen und mittleren Lagen sind bei Pink Lady und mittlerweile auch bei einigen anderen Sorten die Knospen aufgebrochen. Sobald erste grüne Pflanzenteile vorhanden sind, kann es zu Schorfinfektionen kommen.

Vorbeugend behandeln

Wir empfehlen alle **schorfanfälligen Sorten** ab dem Austrieb bis zum Ende der Primärschorfseason vor jeder Regenperiode vorbeugend mit einem Belagsfungizid abzudecken.

Folgende Wirkstoffe können zur Schorfabwehr eingesetzt werden:

- Boscalid
- Pyrimethanil, Cyprodinil
- Captan, Dithianon

- Metiram
- Fluazinam
- Dodine
- Penthiopyrad
- Kupfer
- Fluxapyroxad
- Kaliumphosphonat
- Schwefelkalk

Schorfresistente Sorten

Die „vf-Resistenz“ der bei uns angebauten **schorfresistenten Sorten** basiert auf einem einzigen Gen. Um die Wirkung des vf-Gens so lange wie möglich zu erhalten, empfehlen wir alle vf-resistenten Sorten bei voraussichtlich schweren Millsperioden und/oder starken Sporenflügen zu behandeln.