

## Verbot für bienengefährliche Pflanzenschutzmittel

Das Amt für Obst- und Weinbau hat das Einsatzverbot zum Ausbringen von bienengefährlichen Mitteln wie folgt festgelegt:

- In Anlagen in allen Höhenlagen der Sorte Rosy Glow und anderer Klone der Marke Pink Lady gilt das Verbot ab

**Montag, 4. April 2022 um 00.00 Uhr**

(letzter möglicher Behandlungstag: Sonntag, 3. April).

Unabhängig vom genannten Termin, dürfen bereits vorher blühende Apfelanlagen oder andere blühende Bestände keinesfalls mit einem bienengefährlichen Mittel behandelt werden.

In der Zeit der Bienenwanderung dürfen **nicht** bienengefährliche Insektizide **nur** außerhalb des Bienenflugs eingesetzt werden. Das heißt in den Abendstunden nach Einstellung des Bienenflugs, in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden.

Blühender Unterbewuchs sollte nicht in der Zeit des stärksten Bienenflugs gemulcht werden, da sich sehr viele Bienen auf den Blüten des Unterbewuchses aufhalten. Durch gezielte Absprachen mit den umliegenden Imkern können Probleme bereits im Vorfeld reduziert werden. An den Bienenständen muss ein Schild angebracht sein, auf welchem u. a. auch der Name sowie die Telefonnummer des Imkers angegeben sind. Dies erleichtert eine Kontaktaufnahme.

Der Beratungsring schickt auf Nachfrage die SMS mit dem Start und Ende der Bienenwanderung auch an alle interessierten Imker. Sollte jemand noch Imker kennen, die diesen Dienst gerne in Anspruch nehmen würden, dann können diese mittels E-Mail an [info@beratungsring.org](mailto:info@beratungsring.org) gemeldet werden. Im Mail müssen der vollständige Name und die Telefonnummer des Imkers angegeben werden. Für die übrigen Anbaulagen werden wir den Beginn der Bienenwanderung über SMS vorankündigen.

## Sommerapfelblattsauger und Apfeltriebsucht

Bisher konnte noch kein Sommerapfelblattsauger gefangen werden. Wir empfehlen folgende Abwehrstrategie:

- Beim **Rote Knospen-Stadium** sollte eine Behandlung mit **Etofenprox** durchgeführt werden.

- Ungefähr zwei Wochen nach der Vorblütenbehandlung empfehlen wir eine Behandlung mit einem **Tau-Fluvalinatmittel**.

Da diese Behandlung in die Zeit der Bienenwanderung fällt, **muss** sie außerhalb des Bienenflugs (früher Morgen oder in den Abendstunden) durchgeführt werden.

## Mehlige Apfelblattlaus

Aufgrund des Befallsdrucks in den letzten Jahren, sind in den allermeisten Anlagen zwei Behandlungen für eine erfolgreiche Bekämpfung notwendig.

Folgende Wirkstoffe können eingesetzt werden:

- Tau-Fluvalinate
- Acetamiprid
- Flonicamid
- Spirotetramat
- Sulfoxaflor
- Flupyradifurone
- Pirimicarb
- Azadirachtin

### Was ist bei einem Einsatz zu beachten?

- Temperatur: mindestens 10 °C
- Luftfeuchtigkeit: mindestens 50 %
- Antrocknungszeit: mindestens 4 Stunden
- Mischbarkeit: die Mittel sind mit den anderen in der Vorblüte gebräuchlichen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Wir empfehlen keinen Zusatz von Blattdüngern.