

## Goldgelbe Vergilbung - Abwehr der Amerikanischen Rebzikade

### Überetsch und Unterland bis Pfatten

Aufgrund der vom Pflanzenschutzdienst ausgewiesenen Befallszonen, sind heuer zur Abwehr der Amerikanischen Rebzikade im gesamten Unterland bis Pfatten und im Überetsch (Eppan, Kaltern) zwei Behandlungen für den integrierten Anbau und drei Behandlungen für den Bioanbau **verpflichtend vorgeschrieben**.

### Etschtal

In den Weinbauzonen der Gemeinde Bozen sind zwei Behandlungen für den integrierten Anbau und drei Behandlungen für den Bioanbau **verpflichtend vorgeschrieben**.

Dieselbe Anzahl an Behandlungen **empfehlen** der Südtiroler Beratungsring und der Pflanzenschutzdienst auch für die Weinbauzonen in Leifers, Branzoll, Terlan, Andrian und Nals.

### Burggrafenamt

Im Burggrafenamt wurden bisher vom Pflanzenschutzdienst keine Befallszonen ausgewiesen.

Im gesamten Weinbaugebiet des Burggrafenamtes **empfehlen** der Südtiroler Beratungsring und der Pflanzenschutzdienst eine Behandlung für den integrierten Anbau und zwei Behandlungen für den Bioanbau.

### Verpflichtende Behandlungen sind gesetzlich geregelt


Zur Überwachung der verpflichtenden Behandlungen werden von Seiten des Pflanzenschutzdienstes stichprobenartig Kontrollen durchgeführt.

Beim ausschließlichen Einsatz von im biologischen Anbau (EU VO 2018/848) zugelassenen Insektiziden müssen mindestens drei Behandlungen im Abstand von sieben bis zehn Tagen durchgeführt werden.

Beim Einsatz von synthetischen Insektiziden müssen mindestens zwei Behandlungen durchgeführt werden.

Beim Einsatz einer Kombination von Insektiziden (synthetisch und im biologischen Anbau zugelassen) müssen mindestens drei Behandlungen durchgeführt werden.

### Mittel

Handelsname	Wirkstoff	Dosierung		Einsätze	
		pro hl (10/13 hl/ha)	max. pro ha	max. pro Schädling	max. pro Jahr
Epik SL	Acetamiprid	115/150 ml	1,5 l	1x Amerikanische Rebzikade	2
Kestrel		34/45 ml	0,45 l	1x Amerikanische Rebzikade	1
Trebon Up, Sword Up	Etofenprox	38/50 ml		1x Amerikanische Rebzikade	1
Evure Pro, Mavrik Smart	Tau-Fluvalinate	23/30 ml	0,3 l	1x Amerikanische Rebzikade, 1x Kirschessigfliege; wird nur gegen Kirschessigfliege empfohlen	2
Asset Five	Pyrethrine	53/64 ml	0,96 l	3x Amerikanische Rebzikade	3
Biopiren Plus		160 ml	2,4 l	3x Amerikanische Rebzikade	3
Biovis		160 ml	2,4 l	3x Amerikanische Rebzikade	3
Pyganic 1.4 		230/300 ml	3 l	2x Amerikanische Rebzikade	2
Naturalis	Beauveria bassiana	115/150 ml	1,5 l	5x Amerikanische Rebzikade	5

### Einsatzzeitraum

Höhenlage	1. Behandlung	2. Behandlung
bis 400 m	10. bis 17. Juni	7 bis 10 Tage später
über 400 m	15. bis 22. Juni	7 bis 10 Tage später