

Carpocapsa: l'andamento meteorologico è favorevole

Le temperature elevate e l'andamento meteorologico siccitoso sono stati molto favorevoli allo sviluppo della carpocapsa.

Si possono impiegare le seguenti sostanze attive:

- Spinosad, Spinetoram
- Fosmet
- Clorantraniliprole

- Emamectina benzoato
- Triflumuron, Metossifenoziide, Tebufenoziide
- Acetamiprid
- Confusione sessuale
- Virus della granulosa

Notizie attuali sulla cimice asiatica

Nel numero 02/22 di **frutta e vite** (disponibile online), molti articoli sono stati dedicati proprio alla cimice asiatica.

Lancio di *Trissolcus japonicus*

Anche per quest'anno è stata inoltrata la richiesta – presso il Ministero dell'ambiente – di autorizzazione al lancio di *Trissolcus japonicus* (vespa samurai). In questi giorni è giunta l'autorizzazione. L'allevamento di Icneumonidi e il loro lancio vengono curati dai collaboratori del Centro di Sperimentazione Laimburg. I primi lanci sono previsti per metà giugno.

In totale saranno effettuati in 42 località, la maggior parte delle quali coincidono con quelle dello scorso anno, mentre è stato aumentato il loro numero in Val d'Isarco.

Il Servizio Fitosanitario provinciale ha stabilito che nel raggio di 1 km dalla località in cui si effettua il lancio di *Trissolcus japonicus* non possono essere rilasciate altre specie di Icneumonidi.

Lancio di *Anastatus bifasciatus*

Il Consorzio Mela Alto Adige ha acquistato, per quest'anno, 180.000 individui della specie autoctona di Icneumonidi *Anastatus bifasciatus*, da lanciare in cinque diverse località (Plaus, Merano, Nalles, Caldaro e Vadena) tra inizio/fine giugno e fine luglio) in date successive.

Sulla base delle prescrizioni riportate sul decreto del Servizio Fitosanitario provinciale (distanza di 1 km da località nelle quali è stato lanciato *T. japonicus*), il rilascio di *Anastatus bifasciatus* è possibile in poche aree.

Segnalare i rinvenimenti di cimici

Chiunque rinvenga nei propri frutteti o su diverse piante ospiti individui di cimice asiatica, di cimici autoctone o anche di ovature, dovrebbe segnalarlo all/la consulente di zona via WhatsApp. Sarebbe anche opportuno allegare una foto dell'insetto con indicazione del frutteto ed eventualmente del numero di particella.

Anche il Centro di Sperimentazione Laimburg accetta grandi quantità di cimici asiatiche per l'allevamento in corso.