

## Ricamatori dei frutti

In occasione del nostro monitoraggio abbiamo riscontrato la presenza, nelle zone soggette a forti attacchi di ricamatori, di larve della prima generazione estiva presumibilmente di *Adoxophyes orana* (capua), lunghe almeno 0,5 cm.

### Effettuare controlli

Nei frutteti colpiti in primavera, consigliamo di effettuare un attento controllo. Una buona opportunità è fornita anche dal diradamento manuale attualmente in corso. Si dovrebbero controllare soprattutto i **getti ancora in vegetazione** nella zona della vetta e i **mazzetti a frutto**. Se durante un controllo si rinvencono più di 5 larve/100 getti o più di 3 larve/500 frutti, consigliamo di trattare.

## Afide lanigero: aumenta il grado di parassitizzazione

Nella maggior parte degli impianti il grado di attacco dell'afide lanigero è stabile. Il grado di parassitizzazione ad opera di *A. mali* aumenta anche grazie alle elevate temperature e alla persistenza del bel tempo. In qualche frutteto, invece, la pressione di attacco è in aumento.

### Prodotti per intervenire in estate

Nel caso in cui il grado di parassitizzazione non sia sufficiente e a causa di un grave attacco ai getti fosse già in atto un imbrattamento dei frutti, si può utilizzare **pirimicarb**.