

## La stagione della ticchiolatura è iniziata

Nelle zone precoci e mediamente favorite dal clima, la varietà Pink Lady – e anche altre – ha raggiunto lo stadio di rottura gemme. Non appena sono visibili i primi organi verdi delle piante è possibile che si verifichino infezioni di ticchiolatura. Per questo, il servizio di allertamento antiticchiolatura è ora attivo.

### Trattare preventivamente

Su tutte le **varietà sensibili alla ticchiolatura** consigliamo di coprire preventivamente con un fungicida di copertura tutti i periodi piovosi tra lo stadio della ripresa vegetativa e la conclusione della stagione delle infezioni primarie di ticchiolatura.

Per la difesa dalla ticchiolatura si possono impiegare le seguenti sostanze attive:

- Boscalid
- Pirimetanil, Ciprodinil

- Captano, Ditanon
- Metiram
- Fluazinam
- Dodina
- Penthiopyrad
- Prodotti rameici
- Fluxapyroxad
- Fosfonato di potassio
- Polisolfuro di calcio

### Varietà resistenti alla ticchiolatura

La “resistenza vf” delle **varietà resistenti alla ticchiolatura** che si coltivano in Alto Adige si basa su un unico gene. Per mantenere quanto più a lungo possibile l’efficacia del gene vf consigliamo di trattare tutte le varietà resistenti in caso di gravi infezioni previste e/o in caso di consistente volo ascosporico.