

Divieto di distribuzione di fitosanitari pericolosi per le api

L'Ufficio per la fruttiviteicoltura ha fissato il divieto di distribuzione di fitosanitari pericolosi per le api come segue:

- Negli impianti di tutte le altitudini della varietà Rosy Glow e di altri cloni del marchio Pink Lady il divieto entra in vigore a partire da

lunedì 4 aprile 2022 alle 00.00

(ultima data possibile per trattare: domenica 3 aprile).

Indipendentemente dalla data riportata, i meleti o altre piante già in fioritura non possono in nessun caso essere trattati o raggiunti da prodotti fitosanitari pericolosi per le api.

Nel periodo della migrazione delle api, gli insetticidi **non** pericolosi per questi insetti possono essere distribuiti **solo** al di fuori della fase di volo delle api stesse. Ciò significa che bisogna intervenire una volta che il volo è concluso, durante le ore notturne o nelle prime ore del mattino.

Durante il periodo di massima intensità del volo non si dovrebbe pacciamare il sottofila in fioritura, dato che molte api si soffermano sui fiori di queste essenze.

Una condivisione mirata delle informazioni con gli apicoltori che operano in zona può contribuire a risolvere problemi prima ancora che insorgano. Per facilitare i contatti, presso le arnie si deve appendere un cartello che riporti il nome e il recapito telefonico dell'apicoltore.

Su richiesta, il Centro di Consulenza invia anche a tutti gli apicoltori interessati un SMS con le date di inizio e di fine del periodo di migrazione delle api. Se qualche Socio conosce un apicoltore interessato a questo servizio, può segnalarlo scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@centrodiconsulenza.org indicando il nome completo e il recapito telefonico dell'apicoltore.

Per le altre zone di coltivazione/varietà, l'inizio della migrazione delle api sarà segnalata via SMS.

Psilla estiva e scopazzi del melo

Finora non è stato catturato ancora alcun esemplare di psilla estiva. Consigliamo di seguire la seguente strategia di difesa:

- Allo **stadio di mazzetti divaricati** si dovrebbe effettuare un trattamento con **etofenprox**.

- All'incirca due settimane dopo il trattamento di pre-fioritura consigliamo di intervenire con un **prodotto a base di tau-fluvalinate**.

Poiché questo trattamento si effettua durante la migrazione delle api, **deve assolutamente** essere eseguito al di fuori del periodo di volo delle api (al mattino presto o nelle ore serali).

Afide grigio

Data l'elevata pressione di attacco degli ultimi anni, nella maggior parte dei frutteti è necessario effettuare due trattamenti per una efficace difesa antifidi.

Si possono impiegare le seguenti sostanze attive:

- Tau-Fluvalinate
- Acetamiprid
- Flonicamid
- Spirotetramat
- Sulfoxaflor
- Flupyradifurone
- Pirimicarb
- Azadiractina

A che cosa fare attenzione quando si usano questi prodotti?

- Temperatura: almeno 10 °C
- Umidità dell'aria: almeno 50%
- Tempo di asciugatura: almeno 4 ore
- Miscibilità: i prodotti sono miscibili con gli altri fitosanitari di uso comune in pre-fioritura. Consigliamo di non aggiungere concimi fogliari.