

Flavescenza dorata – la difesa da *Scaphoideus titanus*

Oltradige e Bassa Atesina fino a Vadena

Dato che il Servizio Fitosanitario provinciale ha identificato zone di attacco in questi territori, per quest'anno è prevista l'**esecuzione obbligatoria** di 2 e di 3 interventi di difesa rispettivamente in viticoltura integrata e biologica, praticate in tutta la Bassa Atesina fino a Vadena e nell'Oltradige (Appiano, Caldaro).

Val d'Adige

Nelle zone viticole del Comune di Bolzano è prevista l'**esecuzione obbligatoria** di due trattamenti in viticoltura integrata e di tre trattamenti in viticoltura biologica. Il Centro di Consulenza e il Servizio Fitosanitario provinciale **consigliamo** di effettuare lo stesso numero di interventi di difesa anche nelle aree viticole di Laives, Bronzolo, Terlano, Andriano e Nalles.

Burgraviato

Finora, il Servizio Fitosanitario provinciale non ha identificato zone di attacco nel Burgraviato.

In tutto il comprensorio viticolo del Burgraviato, il Centro di Consulenza e il Servizio Fitosanitario provinciale **consigliano** di effettuare un trattamento in viticoltura integrata e due trattamenti in viticoltura biologica.

I trattamenti obbligatori sono regolamentati dalla legge


Per la verifica dell'esecuzione dei trattamenti obbligatori, il Servizio Fitosanitario provinciale effettua controlli a campione.

Se si utilizzano esclusivamente insetticidi autorizzati in viticoltura biologica (Regolamento UE 2018/848) è necessario effettuare almeno 3 trattamenti mantenendo un intervallo tra loro di 7 – 10 giorni.

Se si impiegano insetticidi di sintesi si devono effettuare almeno due trattamenti.

Se si distribuiscono sia insetticidi di sintesi che autorizzati in viticoltura biologica si devono effettuare almeno tre trattamenti.

Prodotti

form. comm.	s.a.	dose		Interventi	
		/hl (10/13 hl/ha)	max. /ha	max. /parassita	max. /anno
Epik SL	acetamiprid	115/150 ml	1,5 l	1x <i>Scaphoideus titanus</i>	2
Kestrel		34/45 ml	0,45 l	1x <i>Scaphoideus titanus</i>	1
Trebon Up, Sword Up	etofenprox	38/50 ml		1x <i>Scaphoideus titanus</i>	1
Evure Pro, Mavrik Smart	tau-fluvalinate	23/30 ml	0,3 l	1x <i>Scaphoideus titanus</i> , 1x <i>Drosophila suzukii</i> ; consigliato solo contro <i>Drosophila suzukii</i>	2
Asset Five	piretrine	53/64 ml	0,96 l	3x <i>Scaphoideus titanus</i>	3
Biopiren Plus		160 ml	2,4 l	3x <i>Scaphoideus titanus</i>	3
Biovis		160 ml	2,4 l	3x <i>Scaphoideus titanus</i>	3
Pyganic 1.4 		230/300 ml	3 l	2x <i>Scaphoideus titanus</i>	2
Naturalis	<i>Beauveria bassiana</i>	115/150 ml	1,5 l	5x <i>Scaphoideus titanus</i>	5

Momenti di intervento

altitudine	1° trattamento	2° trattamento
fino a 400 m	10 – 17 giugno	7 - 10 gg più tardi
oltre 400 m	15 – 22 giugno	7 – 10 gg più tardi

Le indicazioni sui momenti di intervento con i prodotti vengono fornite via SMS e tramite l'app