

Bei Gala und SweeTango bereits an die Ernte denken

In den frühen Lagen südlich von Bozen wird die Gala-Ernte aus heutiger Sicht wahrscheinlich ab dem 10. August beginnen. Bei SweeTango rechnen wir mit einem Erntebeginn in der dritten Augustwoche.

Daher ist es an der Zeit, bei diesen Sorten an die Abschlussbehandlungen zu denken.

- **Captanmittel** sollten zur Schorfbekämpfung eingesetzt werden.

- Bei Gala sollte zur Bekämpfung der Lagerkrankheiten vor der Ernte eine Behandlung mit **Fludioxonil** eingeplant werden.
- **Kupfermittel** können bei Gala in Anlagen mit hohem Schorfbefall bzw. wenn das Captanmittel vorzeitig abgewaschen wurde, kurz vor der Ernte eingesetzt werden.

Bläulingszikade

In Apfelanlagen mit Vorjahresbefall sind seit ca. 10 bis 14 Tagen Larven der Bläulingszikade (*Metcalfa pruinosa*) zu beobachten.

Bekämpfung

Acetamipridmittel haben eine Nebenwirkung auf die Larven der Bläulingszikade. Wird eine Behandlung gegen

Wanzen mit einem Acetamipridmittel durchgeführt, kann diese Nebenwirkung genutzt werden.

Etofenprox hatte nach unseren Beobachtungen nur eine kurz anhaltende Wirkung. Nach einer Behandlung stieg der Befall innerhalb kurzer Zeit wieder an.