



Abschlussbehandlungen bei den Herbstsorten

Golden Delicious

Die Abschluss-spritzung kann mit einem **Captanmittel** (21 Tage Karenzzeit) durchgeführt werden. Bei Bedarf kann noch **Boscalid** oder **Fludioxonil** eingesetzt werden.

Red Delicious, Granny Smith, Fuji, Braeburn, Morgenduft, Winesap, Scifresh (Jazz®), Nicoter (Kanzi®), Pinova, Jonagold

Bei diesen Sorten kann für die Abschluss-spritzung ein **Captanmittel** und bei Bedarf **Boscalid** oder **Fludioxonil** verwendet werden. Auch der Einsatz eines **Kupfersulfatmittels** ist möglich.

Cripps Pink

Bei dieser Sorte kann die Abschluss-spritzung mit einem **Captanmittel** durchgeführt werden. Bei Bedarf kann noch **Boscalid** eingesetzt werden.

Verhinderung des vorzeitigen Fruchtfalls

Vorzeitiger Fruchtfall kann durch den Einsatz von NAA-Mitteln vorgebeugt werden.

Apfelwickler

Bei Bedarf stehen **Emamectin** oder **Spinosadmittel** zur Verfügung.

Hinweis des Landespflanzenenschutzdienstes

Südtirol ist schon seit längerem als Befallsgebiet für **Feuerbrand** und **Apfeltriebsucht** ausgewiesen. Deshalb macht der Landespflanzenenschutzdienst alle Obstbauern darauf aufmerksam, dass es **strengstens**

verboten ist, in den Obstanlagen Edelreiser zu schneiden, um sie als Vermehrungsmaterial weiterzugeben.