

Bei Gala bereits an die Ernte denken

Die Gala-Ernte wird heuer ca. zehn Tage früher beginnen als im Vorjahr.

- In Gala-Anlagen können gegen Schorf noch Kupfersulfatmittel sowie Captanmittel eingesetzt werden.
- Ein Einsatz von Dodinemitteln bei Gala ist aufgrund der Karenzzeit von 40 Tagen nicht mehr möglich.

- In starken Alternaria-Befallslagen können Kaliumphosphite, Boscalid oder Fludioxonil zur Alternaria-Abwehr eingesetzt werden.
- Auch bei Früchten, die der industriellen Verwertung zugeführt werden, sind die gesetzlichen Karenzzeiten einzuhalten.

Weitere gesetzliche Änderung bei Dodine

Mit dem Ministerialdekret vom 8. Juli 2014 wurde das Etikett der Dodinemittel nochmals abgeändert. Ab diesem Zeitpunkt sind nur mehr drei Behandlungen pro Jahr erlaubt. Dafür dürfen pro Einsatz und ha

behandelter Fläche nun 1,38 kg Syllit 65 aufgewendet werden (76/92 g/hl). Die Karenzzeit von 40 Tagen bleibt unverändert.

Herbizideinsatz im Sommer

Oxyfluorfenmittel dürfen nur bis zum 10. Mai eingesetzt werden. MCPA-Mittel haben eine Karenzzeit von 80 Tagen. Deshalb müssen im Sommer Glyphosatmittel

aufgrund fehlender Mischpartner alleine ausgebracht werden.