



## Rückblick auf die Primärschorfsaison 2015

Der Befall ist heuer um einiges geringer als in den vergangenen Jahren.

Die meisten Schorfflecken gehen auf die Regenphasen vom 17. bis 18. bzw. vom 26. bis 28. April zurück. Flecken die auf die Infektionsperiode vom 17. bis 18. April zurückgehen, sind auf dem 2. bis 4. Blatt zu finden. Jene der Periode vom 26. bis 28. April findet man auf dem 5. bis 7. Blatt.

### Schorfabwehr im Sommer

Fungizide für die Schorfabwehr im Sommer:

- Captan
- Dodine
- Kupfersulfat

Wer die Oberkronenberegnung einsetzt, sollte die Blattnassperioden so kurz wie möglich halten.

## Alternaria

Die feucht-schwüle Witterung in den ersten beiden Juniwochen hat den Alternariabefall bei den anfälligen Sorten Gala, Golden Delicious und Cripps Pink in den Befallslagen der Talsohle ansteigen lassen.

Fungizide für die Alternaria-Abwehr im Sommer siehe PAN-Rundschreiben Nr. 8.

### Einsatz der Oberkronenberegnung

In Anlagen mit Alternariaproblemen sollte im Sommer nicht mit der Oberkronenberegnung bewässert werden.

## Erster Feuerbrandfall

Am 15. Juni wurde in der Gemeinde Schluderns auf nachgepflanzten Bäumen der Sorte Pinova Feuerbrandbefall entdeckt. Von den ca. 200 nachgepflanzten Bäumen sind bisher 15 bis 20 befallen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Blüteninfektionen. Bitte

kontrollieren Sie nun vor allem heuer gepflanzte Bäume auf Feuerbrandsymptome. Bei Verdachtsfällen kontaktieren Sie bitte ihren Berater oder den Pflanzenschutzdienst Bozen (0471/415140).

## Zikaden

Bei der letztjährigen Ernte ist es vereinzelt zu Fruchtbeschmutzungen bzw. Blattschäden durch Rosen- oder Rebenzikaden gekommen. Zurzeit ist der Besatz mit Zikadenlarven noch gering. Werden bei einer visuellen Kontrolle 50 Larven pro 100 Blätter gezählt, ist die Eingreifschwelle erreicht.

Für die Bekämpfung stehen folgende Wirkstoffe zur Verfügung:

- Buprofezin
- Indoxacarb

Beide Mittel wirken gegen die Larvenstadien der Rosen- und Rebenzikaden.