

## Abschlussbehandlungen bei den Herbstsorten

Durch die sehr warme und trockene Witterung in den letzten Wochen, ist der Schorfdruck in den Anlagen gering. Nur vereinzelt tritt Sekundärschorfbefall auf den Blättern auf. Lange Blattnassperioden sollten trotzdem vorbeugend mit einem Kontaktfungizid (Captan, Kupfersulfat oder Dodine) abgedeckt werden.

Die Gala-Ernte in den frühen Lagen wird in der nächsten Woche beginnen. Auch die Herbstsorten sind von der Ernte nur mehr wenige Wochen entfernt.

### Golden Delicious

Wirkstoffe zur Schorfabwehr:

- Captan
- Boscalid

Wirkstoffe zur Alternariaabwehr:

- Boscalid
- Fludioxonil
- phosphonathaltige Blattdünger

**Red Delicious, Granny Smith, Fuji, Braeburn, Morgenduft, Winesap, Scifresh (Jazz®), Nicoter (Kanzi®), Pinova, Jonagold, Scilate (Envy®), CIVG 198 (Modi®)**

Wirkstoffe zur Schorfabwehr:

- Captan
- Kupfersulfat

Wirkstoffe gegen Lagerfäulen/Gloeosporium

- Boscalid
- Fludioxonil
- Captan

### Cripps Pink

Wirkstoffe zur Schorfabwehr:

- Captan
- Boscalid

Wirkstoffe zur Alternariaabwehr:

- Boscalid
- Fludioxonil
- Dodine
- phosphonathaltige Blattdünger

### Abdrift und unerwünschte Rückstände vermeiden

Je näher man der Ernte kommt, desto wichtiger wird es, die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln auf biologisch bewirtschaftete Flächen und auf Sorten mit unterschiedlichem Erntezeitpunkt zu vermeiden.

Folgende Punkte sollten deshalb besonders beachtet werden:

- Pflanzenschutzmittel nur bei Windstille ausbringen.
- Zielgerichtet sprühen, überflüssige Düsen schließen und die Luftleistung dem Baumvolumen anpassen (Sprühnebel sollte nicht bis an die nächste Reihe gelangen).
- Die letzte Reihe bei Sprühgeräten mit Gebläseaufsatz bzw. die letzten beiden Reihen bei Geräten ohne Gebläseaufsatz nur in Richtung des zu behandelnden Sortenblocks bzw. des eigenen Grundstücks behandeln.
- Das Fass gut ausspülen. Dies ist besonders wichtig, wenn man mit demselben Sprühgerät auch Mittel ausbringt, die nur für eine andere Kultur (z. B. im Weinbau) zugelassen sind.

## Verhinderung des vorzeitigen Fruchtfalls

Bei Sorten die zu vorzeitigem Fruchtfall neigen (z. B. Red Delicious, Scifresh (Jazz®), CIVG 198 (Modi®), Winesap),

kann Obsthormon 24a eingesetzt werden.

## Apfelwickler

Vor allem in Anlagen mit Ausgangsbefall der ersten Generation, sollten ab sofort periodische Kontrollen durchgeführt werden.

Bei Überschreiten der Eingreifschwelle (vier frisch angebohrte Früchte auf 500 kontrollierte):

- Emamectin
- Spinosad

## Hinweis des Landespflanzenenschutzdienstes

Südtirol ist schon seit längerem als Befallsgebiet für **Feuerbrand** und **Apfeltriebsucht** ausgewiesen. Deshalb macht der Landespflanzenenschutzdienst alle Obstbauern

darauf aufmerksam, dass es **strengstens verboten** ist, in den Obstanlagen Edelreiser zu schneiden, um sie als Vermehrungsmaterial weiterzugeben.