


## Primärschorfseason 2016



Millsperiode: □ leicht, ▨ mittel, ■ schwer  
 Sporenflug Neumarkt: □ leicht, □ m mittel, □ s stark  
 □ Blattnässe nicht ausreichend, ● mit Flecken  
 ↓ zusätzliche rückwirkende Spritzung empfohlen

### Schorfabwehr im Sommer

In den letzten Wochen waren sehr lange Blattnassperioden bzw. hohe Niederschlagsmengen zu verzeichnen.

Wirkstoffe im Sommer: siehe Rundschreiben Nr. 10.

### Alternaria

Die feucht-schwüle Witterung der letzten Wochen hat in den starken Befallslagen der Etschtalsole trotz Behandlungen zu frischem Fruchtbefall bei der Sorte Gala geführt. Bei Golden Delicious und Cripps Pink sind bisher

keine Fruchtflecken zu finden. In einigen Zonen hat bei Golden Delicious physiologischer Blattfall eingesetzt. Wirkstoffe gegen Alternaria: siehe Rundschreiben Nr. 7.

### Etikettenänderung bei einigen Captanmitteln

Mit einem Ministerialdekret wurden am 6. Juni 2016 die Etiketten einiger bei uns gebräuchlichen Captanmittel abgeändert. Davon betroffen sind u. a. die Mittel **Merpan 80 WG**, **Sarcap 800** oder **Santhane WG**. Es wurden auch Hektarhöchstdosierungen eingeführt. Ab dem 6. Juni 2016

dürfen von diesen Mitteln nur mehr maximal 2 kg/ha und Einsatz verwendet werden. Nach dem 6. Juni 2016 dürfen Mittel mit altem Etikett unter Berücksichtigung der neuen Hektarhöchstdosierung aufgebraucht werden.

### Fruchtschalenwickler

Seit einigen Wochen registrieren wir einen Falterflug des Fruchtschalenwicklers. In den Befallslagen sollte jetzt eine Trieb- und Fruchtkontrolle durchgeführt werden,

besonders dann, wenn im Frühjahr keine Behandlung erfolgt ist. Wirkstoffe zur Bekämpfung: siehe Rundschreiben Nr. 7.

### Zikaden

Bei der letztjährigen Ernte konnten wir vereinzelt Blattschäden durch Rosen- oder Rebenzikaden beobachten. Aktuell beobachten wir den Flug der adulten

Tiere. Bei Bedarf können folgende Wirkstoffe eingesetzt werden:

- Buprofezin
- Indoxacarb (Nebenwirkung).