

## An die Galaernte denken

Die Gala-Ernte wird aus heutiger Sicht in den frühen Lagen des Unterlandes zwischen 10. und 15. August beginnen. Deshalb ist es an der Zeit, bei dieser Sorte an die Abschlussbehandlungen zu denken.

- Captanmittel können bis drei Wochen vor der Ernte zur Schorfbekämpfung eingesetzt werden.
- Sollten nach der Captanbehandlung mehr als 50 mm Niederschlag fallen, empfehlen wir eine zusätzliche Behandlung mit Boscalid oder Fludioxonil gegen Lagerkrankheiten.
- In Alternaria-Befallslagen sollten bei Bedarf Boscalid oder Fludioxonil in Mischung mit einem

kaliumphosphonathaltigen Blattdünger zur Alternaria-Abwehr eingesetzt werden.

- In Gala-Anlagen mit Schorfbefall eignen sich für die Abschluss-spritzung gegen Schorf in erster Linie Kupfersulfatmittel (Poltiglia Disperss oder Selecta Disperss) mit einer Karenzzeit von sieben Tagen.
- Auch bei Früchten die der industriellen Verwertung zugeführt werden, müssen die gesetzlichen Karenzzeiten eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Brühereste von anderen Mitteln im Spritzmitteltank verblieben sind, wenn Sie Gala-Anlagen behandeln. Diese waren in Vergangenheit oft die Ursache für zunächst unerklärliche Rückstände.