

## Mehltau

Aufgrund der warmen Witterung im vergangenen Sommer ist der Ausgangsbefall beim Mehltau heuer etwas höher als in den letzten Jahren.

Zur Wirkstoffwahl siehe Rundschreiben Nr. 4 vom 23. März 2016



## Erster Feuerbrandfall

Am 18. April wurde im Gemeindegebiet von Prad am Stilfserjoch der erste Feuerbrandfall des Jahres entdeckt. In einer zweijährigen Pinova-Anlage wurden überwinternde Canker im Unterlagenbereich der Bäume festgestellt (siehe nebenstehendes Foto). Bei einigen Cankern trat auch Bakterien Schleim aus. Von den 900 Bäumen in der Anlage mussten bisher ca. 150 gerodet werden.

In der heurigen Saison waren die Bedingungen für Feuerbrandblüteninfektionen in den Ertragsanlagen vor allem zu Beginn der Blüte gegeben (5. bis 7. April). Sollte es zu diesem Zeitpunkt zu Infektionen gekommen sein, sind die Symptome nun sichtbar.

Bei den heuer gepflanzten Bäumen welche nun blühen, steht die gefährliche Zeit für Blüteninfektionen mit den steigenden Temperaturen unmittelbar bevor.

