



Die Schorfsaison hat begonnen

In den letzten Februartagen sind in den frühesten Lagen bei Cripps Pink die Knospen aufgebrochen. Sobald erste grüne Pflanzenteile vorhanden sind, kann es zu Schorfinfektionen kommen.

Vorbeugend behandeln

Ab dem Austrieb sollte jede Millsperiode vorbeugend mit einem Kontaktfungizid abgedeckt werden. Die Behandlung sollte so kurz wie möglich vor Regenbeginn erfolgen.

Zur Schorfbekämpfung können folgende Wirkstoffe eingesetzt werden:

- Trifloxystrobin
- Pyraclostrobin
- Boscalid
- Sterolsynthesehemmer (SSH)
- Pyrimetanil
- Cyprodinil

- Captan
- Dithianon
- Dithianon+Kaliumphosphonat
- Propineb
- Metiram
- Mancozeb
- Fluazinam
- Dodine
- Penthiopyrad
- Kupfer
- Schwefelkalk

Die nationalen IP-Richtlinien schreiben vor, dass Dithianon- und Captanmittel je nach Sorte in Summe zwischen 12 und 14 Mal pro Jahr eingesetzt werden können.

Zur Schildlausbekämpfung

Vom Austrieb bis zum Roten Knospenstadium können zur Bekämpfung der Schildläuse folgende Wirkstoffe eingesetzt werden:

- Pyriproxifen
- Paraffinöl
- Buprofezin
- Phosmet