

## Divieto di utilizzo di fitosanitari pericolosi per le api

Dato l'andamento vegetativo in corso, l'Ufficio per la fruttivicultura ha emesso il divieto di utilizzo di fitosanitari pericolosi per le api per tutte le zone di coltivazione situate tra i 500 e gli 800 m s.l.m.:

- il divieto entra in vigore per tutti i frutteti situati tra i 500 e gli 800 m s.l.m.

**giovedì, 19 aprile alle ore 00.00**

(ultimo giorno possibile per trattare: mercoledì 18 aprile).

Indipendentemente dal termine suddetto, è fatto divieto assoluto di intervenire su piante da frutto in fioritura o su altre specie vegetali in fioritura con prodotti pericolosi per gli insetti pronubi.

## Catturata la prima psilla estiva

Il 6 aprile, a Prissiano è stata catturata la prima psilla estiva della stagione con una trappola cromotropica. Informazioni sulla difesa mirata sono reperibili sulla circolare n° 5.

Consigliamo di intervenire sulle giovani piante messe a dimora quest'anno non appena riprendono a vegetare.

## Utilizzo di carbossamidi per la difesa antiticchiolatura

Le carbossamidi come Sercadis o Fontelis possono essere impiegate per la difesa preventiva dalla ticchiolatura. Poiché sono ad elevato rischio resistenza, non dovrebbero essere distribuiti in sequenza diretta,

bensì alternati con fungicidi di contatto. Nel periodo delle infezioni primarie, consigliamo di effettuare al massimo due interventi con carbossamidi.