

## Vegetationsstand

In der warmen Weinbauzone Rentsch bei Bozen war am 1. April bei der Sorte Vernatsch bereits das 3-Blattstadium erreicht und in den warmen Lagen um

den Kalterer See und im Unterland das 1- bis 2-Blattstadium. Damit ist die Rebentwicklung Anfang April ähnlich wie im sehr frühen Jahr 2011.

## Mehltau

Bei starkem Vorjahresbefall sollte bei den hoch mehltauanfälligen Sorten ab dem 5-Blattstadium mit der Mehltaubekämpfung begonnen werden.

Vor allem in bekannt kritischen Lagen sollten Kontrollen ab dem 6- bis 8-Blattstadium durchgeführt werden.

Wirkstoffe: Schwefel, Meptyldinocap, Quinoxifen, Bupirimat, Metrafenon, Cyflufenamid, Spiroxamin, Tetraconazol.



RUNDSCHREIBEN WEINBAU  
CIRCOLARE VITICOLTURA  
Autorisierung Trib. Bozen Nr.9 vom 08.02.2013  
Verantwortlich: H. Hafner  
Autorizzato dal Trib. di Bolzano n°9 del 08.03.2013  
Responsabile: H. Hafner

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in a.p.  
D.L. 353/2003  
(conv.in L.27/02/2004  
n46)  
Art.1, comma 2 e 3,  
CNS Bolzano

*Jahrgang 38 – 08.04.2014, Nr. 22*

**Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau**  
**Centro di Consulenza per la fruttivitticoltura dell'Alto Adige**

Andreas Hofer Strasse 9/1 I-39011 Lana  
Via Andreas Hofer 9/1 I-39011 Lana  
Tel. 0473.553455

«Nachname» «Vorname»  
«Firma»  
«Adresse»

«Land» - «PLZ» «Ort» «Fraktion» («Provinz»)