



## Vegetationsstand

Im Vergleich zum Vorjahr gab es heuer im Mai weniger kühle Wetterphasen. Der Triebzuwachs lag zuletzt bei zwei bis drei Blättern pro Woche. Aus diesem Grund schritt die Entwicklung der Reben im abgelaufenen Monat schnell voran.

### Früher Blühbeginn

Bereits Mitte Mai wurden in den wärmsten Weinbaugebieten erste aufblühende Gescheine gefunden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Blühbeginn somit um rund zwei Wochen früher.

### Blühbeginn im Betriebsheft aufzeichnen

So wie der Erntetermin, muss auch der Blühbeginn bei den einzelnen Sorten im Betriebsheft eingetragen werden. Das Vegetationsstadium „Blühbeginn“ ist dann erreicht, wenn an ca. 10% der Gescheine einzelne Blüten zu beobachten sind.

## Mehltau: Mittelwahl im Sommer

- **Ab Schrotkorngröße:** Schwefelprodukte, Prosper 300 SC, Batam, Concorde 125, Domark, Lidal.

## Peronospora: Mittelwahl im Sommer

- **Ab Schrotkorngröße bis Traubenschluss:** Mancozeb, Metiram, Zoxium 240 SC, Forum 50 WP, Quantum, Kupfer, Phosphonate.
- **Ab Traubenschluss:** Kupfermittel, Forum 50 WP, Quantum, Phosphonate.