

Vegetationsstand

Vegetationsstand

Aufgrund der überdurchschnittlichen Temperaturen ging die Entwicklung der Reben im April zügig voran. Beim Vegetationsstand Mitte April liegen wir im Durchschnitt der letzten 15 Jahre. In der warmen Weinbauzone Rentsch waren am 15. April bei der Sorte Vernatsch

bereits vier Blätter entwickelt. In den frühen Lagen in Kaltern und im Unterland zum selben Zeitpunkt drei bis vier Blätter.

Allgemein verläuft der Austrieb der Reben heuer sehr gleichmäßig.

Mehltau

Geringerer Ausgangsbefall

2014 war ein Jahr mit starkem Mehлтаudruck. Vor allem in den Monaten Mai und Juni zeigte sich der Schadpilz sehr aggressiv. Spätbefall gab es weniger als in den letzten beiden Jahren, weshalb heuer allgemein mit einem geringeren Ausgangsbefall zu rechnen ist.

Bekämpfungsbeginn 2015

Bei starkem Vorjahresbefall empfehlen wir bei den hoch mehltauanfälligen Sorten Vernatsch, Kerner, Müller Thurgau, Chardonnay und Lagrein frühestens ab dem 5-Blattstadium mit der Mehltaubekämpfung zu beginnen.

Wirkstoffe: Schwefel, Meptyldinocap, Quinoxifen, Bupirimat, Metrafenon, Cyflufenamid, Spiroxamin, Tetraconazol, Natriumbicarbonat.