

Vegetationsstand

Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich der Mai heuer bis zum 20. des Monats deutlich wärmer. Darauf folgte bis zum 28. Mai eine deutliche Abkühlung, welche das Triebwachstum und den Blühverlauf verlangsamte.

Nach einem Blattzuwachs von 3 bis 3,5 Blättern pro Woche Mitte des Monats, reduzierte sich dieser in der kühlen Phase auf 2 Blätter pro Woche.

Mehltau: Mittelwahl im Sommer

Blühbeginn bis Schrotkorngröße:

Schwefelmittel, Meptyldinocap, Metrafenon, Cyflufenamid

Schrotkorngröße bis Traubenschluss:

Schwefelmittel, Cyflufenamid, Spiroxamin

Traubenschluss bis Reifebeginn:

Schwefelmittel, Spiroxamin, Tetraconazol, Natriumbicarbonat

Nach Reifebeginn:

Tetraconazol, Natriumbicarbonat, Ampelomyces quisqualis

Peronospora: Mittelwahl im Sommer

Blühbeginn bis Schrotkorngröße:

Folpet, Mancozeb, Metiram, Ametoctradin, Amisulbrom, Cyazofamid, Fluopicolid, Zoxamid, Dimethomorph, Kupfer, Phosphonate

Schrotkorngröße bis Traubenschluss:

Mancozeb, Metiram, Zoxamid, Dimethomorph, Kupfer, Phosphonate

Traubenschluss bis Reifebeginn:

Dimethomorph, Kupfer, Phosphonate

Nach Reifebeginn:

Kupfer