





## Mehltau

### Bekämpfungsbeginn

Nur in Anlagen mit sehr hoch und hoch anfälligen Sorten, wo im Herbst 2017 ein starker Spätbefall aufgetreten ist, empfehlen wir um das 5-Blattstadium eine erste Behandlung. 2017 gab es kaum Anlagen mit starkem Spätbefall, weshalb auch bei hoch und sehr hoch anfälligen Sorten in den meisten Fällen die erste Mehltaubehandlung heuer nicht vor dem 7-Blattstadium erfolgen muss.

### Mittelwahl

In der Vorblütezeit empfehlen wir Schwefelpräparate, Karathane Star  , Barkan  oder Vivando einzusetzen.

Wir empfehlen Karathane Star  oder Barkan  bei den sehr hoch anfälligen Sorten in kritischen Lagen oder bei starkem Vorjahresbefall bzw. maximal einmal pro Jahr einzusetzen. Neben sensiblen Zonen (siehe Kasten) kann als Alternative Heliosoufre S verwendet werden.

### Mehltaubekämpfung neben sensiblen Zonen laut NAP

Bei Mitteln mit bestimmten H-Sätzen muss ein Sicherheitsabstand von 30 Metern zu bestimmten sensiblen Zonen (z. B. Schulen, Kindergärten usw.) eingehalten werden. Durch die Anwendung von abdriftmindernden Maßnahmen kann dieser Sicherheitsabstand auf 10 Meter reduziert werden.