

Abschlussbehandlungen planen

Die Reduzierung der Anzahl sowie der Menge an Pflanzenschutzmittelrückständen im Wein ist ein wichtiges Ziel. Um dieses zu erreichen, sollte der **Abstand zwischen der letzten Behandlung und der Ernte mindestens 40 Tage betragen**.

Sofern sich witterungsbedingt keine größeren Probleme mehr ergeben bzw. in Anlagen mit ruhigem Wachstum, kann mit den Behandlungen auch vor den hier angegebenen Zeiträumen aufgehört werden.

Einsatzzeitraum für die Abschlussbehandlungen gegen Peronospora und Oidium bei einem Abstand von 40 Tagen zum voraussichtlichen Erntebeginn

Sorte	15.-25. Juli	25. Juli- 5. Aug.	5.-15. August	15.-25. August	20.-30. August
Weiß-, Blauburgunder, Ruländer, Chardonnay, Sauvignon	frühe Lagen	mittlere Lagen	spätere Lagen		
Müller Thurgau		mittlere Lagen	spätere Lagen		
Gewürztraminer, Goldmuskateller, Riesling, Kerner		frühe Lagen	mittlere Lagen	spätere Lagen	
Vernatsch, Lagrein, Merlot			frühe Lagen	mittlere Lagen	spätere Lagen
Cabernet					frühe u. mittlere Lagen